

# **Общие правила подготовки к анализам урогенитальных мазков**

## **Отделляемое и соскобы влагалища, цервикального канала, уретры**

### **Назначение:**

- установление возбудителя инфекционного заболевания
- подбор рациональной антимикробной терапии
- оценка эффективности проводимой терапии

### **Влагалище, цервикальный канал**

#### **Подготовка**

**Мед.препараты.** Взятие биологического материала проводится строго до начала применения антибиотиков или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены.

**Месячный цикл.** Исследование не проводится во время менструации.

Биоматериал берут не ранее 5-7-го дня месячного цикла и за 5-7 дней до его окончания.

В течение 2-3 дней следует воздержаться от вагинального секса.

В течение 2-3 суток стоит прекратить использование лечебно-профилактических средств, которые вводятся во влагалище (это касается влагалищных таблеток, шариков, спринцевания, вагинальных контрацептивов).

Сдавать мазок рекомендуется раньше, чем проходить УЗИ, или подождать 2-3 дня после ультразвукового сканирования, т.к. используемый гель может исказить результаты исследования. После кольпоскопии тоже должно пройти 2-3 дня, прежде чем вы отправитесь на анализ.

### **Отделляемое уретры**

#### **Подготовка**

**Мед.препараты.** Взятие биологического материала проводится строго до начала применения антибактериальных и химиотерапевтических препаратов, или не ранее, чем через 10-14 дней после их отмены.

**Менструация.** У женщин исследование не проводится во время менструации.

**Сбор материала.** До или не ранее 2-3 часов после мочеиспускания